

<https://helda.helsinki.fi>

Yläonttolaskimo-oireyhtymä syöpää sairastavalla potilaalla

Lauren, Hanna

2019

Lauren , H & Tarkkanen , M 2019 , ' Yläonttolaskimo-oireyhtymä syöpää sairastavalla potilaalla ' , Duodecim , Vuosikerta. 135 , Nro 16 , Sivut 1483 . < <https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo15077> >

<http://hdl.handle.net/10138/320910>

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



Yläonttolaskimo-oireyhtymä syöpää sairastavalla potilaalla

Kuusikymmentäkahdeksanvuotiaalla miehellä oli aiemmin todettu krooninen lymfaattinen leukemia (KLL). Aktiiviseurannan ja sittemmin solunsalpaajien sekä rituksimabin yhdistelmähoidon hyvän hoitutuloksen myötä seuranta siirrettiin perusterveydenhuoltoon.

Sitten alkoivat yskä ja väsymys. Keuhkokuivassa (**KUVA A**) ylämediastinum oli leventynyt oikealle. Tietotomografiassa (TT) havaittiin välikarsinan yläosassa kookas kasvainmassa. Vastaanotolla muutaman viikon kuluttua yskä oli lisääntynyt ja molemmiin puolin kaulaa havaittiin turvotusta. Päivystyksellisessä TT:ssä tilanne oli edennyt yläonttolaskimo-oireyhtymäksi (**KUVAT B ja C**).

Potilaalle aloitettiin antikoagulaatio, steroidihoito ja kiireellinen sädehoito. Histologinen näyte paljasti, että KLL oli muuntunut diffuusi suurisoluiseksi B-solulymfoomaksi. Sen hoidoksi aloitettiin solunsalpaajien ja rituksimabin yhdistelmä.

Yläonttolaskimo-oireyhtymässä yläonttolaskimo ahtautuu kasvainmassan vuoksi ja hoidon aloituksella on kiire. Antikoagulaatio, steroidihoito sekä tarvittaessa kipulääkitys on aloitettava nopeasti. Jatkohoito on kiireellinen sädehoito tai solunsalpaajahoito, jos hyvin solunsalpaajaherkkä syöpä on tiedossa. ■

HANNA LAUREN, osastonlääkäri
Hus Kuvantaminen

MAIJA TARKKANEN, erikoislääkäri
Hyks Syöpäkeskus ja
Aikakauskirja Duodecim, toimitussihteeri

